

Số: /TB-UBND

Lê Lợi, ngày 23 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Một số biện pháp kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi vụ xuân 2024

Kính gửi các đồng chí trưởng thôn, các hộ xã viên trong toàn xã trong những ngày vừa qua đã xảy ra rét đậm, rét hại, nền nhiệt độ phổ biến 7- 11⁰C đã ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng, vật nuôi.

Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, UBND xã, đề nghị Hợp tác xã DVNN, Các đồng chí trưởng thôn tập trung hướng dẫn, khuyến cáo các hộ nông dân thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

I. PHÒNG CHỐNG RÉT CHO CÂY TRỒNG.

1. Trên cây mạ.

a. Đối với diện tích mạ đã gieo hoặc đã ủ mầm.

- Thường xuyên tưới ẩm đối với mạ nền đất cứng, duy trì mực nước nông đối với mạ được.

- Dùng nylon trắngche phủ kín chống rét cho mạ, không để nylon tiếp xúc với cây trồng, nếu để nylon tiếp xúc với cây trồng khi nước đọng sẽ nén cây.

- Để tăng khả năng chống rét cho mạ sử dụng tro bếp mục, phân chuồng mục, phân lân, phân Kali bón bổ sung cho mạ. Khi thời tiết ấm lên, tuyệt đối không sử dụng phân đạm, phân NPK hàm lượng đạm cao bón thúc cho mạ.

- Khi mạ đã đủ tuổi cấy nhưng thời tiết rét đậm, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15⁰C) không đưa ra cấy được: cần tưới thêm bùn để giữ mạ thời gian lâu hơn, khi thời tiết ấm lên mới đưa ra ruộng cấy.

b. Đối với diện tích mạ ngâm ủ đến thời điểm gieo trùng với những ngày rét đậm rét hại cần tải mỏng ở nơi ẩm và thoáng, đảm bảo đủ ẩm, khi thời tiết ấm thì đem gieo.

Thực hiện nghiêm đúng lịch thời vụ theo Phương án sản xuất số 119/PA-UBND ngày 02/11/2023 của UBND huyện Gia Lộc về Phương án sản xuất vụ Đông xuân năm 2023- 2024, cụ thể:

Giống Q5, VNR20, Đài thơm 8, nếp: gieo mạ nền đất cứng từ ngày 20 - 30/1/2024; gieo thẳng từ ngày 05 - 10/02/2024.

Giống Bắc thơm 7, TBR225, TBR 279, Hà phát 3: gieo mạ nền từ ngày 01 - 10/02/2024; gieo thẳng từ ngày 05 – 20/02/2024

** Công tác chuẩn bị giống.*

Kiểm tra tỷ lệ nảy mầm trước khi bước vào thời vụ. Phơi lại hạt giống trong nắng nhẹ từ 4 - 5 giờ để tăng tỷ lệ nảy mầm và độ đồng đều. Loại bỏ các hạt thóc lép, lửng.

** Lượng thóc giống cho 1 sào Bắc Bộ:*

- Làm mạ nền đất cứng: 1,5 - 1,8kg.

-Gieo thẳng:

+ Giống Q5, Thiên ưu 8, VNR20, Đài thơm 8, nếp: 1,2 - 1,3kg.

+ TBR225, TBR279, Hà phát 3, CNC11: 1,0 - 1,2kg.

** Xử lý, ngâm ủ thóc giống.*

- Xử lý hạt giống, diệt mầm bệnh bằng 1 trong các phương pháp sau:

+ Dùng nước nóng 54⁰C ngâm hạt giống trong 10 phút.

+ Xử lý bằng nước vôi 2% (dùng 2 lạng vôi tôi hoà với 10 lít nước rồi gạn lấy nước trong) ngâm 8- 10 giờ rồi rửa sạch nước vôi, tiếp tục ngâm giống. Trong quá trình ngâm thay nước, rửa chua 8 - 10 giờ/lần. Khi hạt thóc trắng mếp thì rửa sạch để ráo nước rồi ủ thúc mầm.

-Ủ hạt giống: nhiệt độ thích hợp cho thóc nảy mầm từ 30 - 32⁰C, trời lạnh ủ hạt giống trong thùng hoặc bao, để nơi cao thoát nước, gần nguồn nhiệt. Trời lạnh ngâm trong nước ấm trước khi ủ. Khi hạt nứt nanh, ngày ngâm đêm ủ để mầm và rễ ra đều. Thực hiện theo phương châm “*mùa nứt nanh, chiêm xanh đầu*”.

** Kỹ thuật gieo mầm trên nền đất cứng.*

1 sào lúa cần 5 - 6 m² mạ. Dùng đất bột hoặc bùn mương trộn đều với 5 kg phân chuồng hoai mục + 2 kg Super lân, lót nền bằng trấu hoặc bao đã ráo, nền gieo phẳng, sạch cỏ dại. Rải hỗn hợp trên dày 2 - 3 cm, chia hạt giống 2 - 3 phần để gieo cho đều, phủ mặt 1 lớp đất bột mỏng, tưới nước ẩm. Nếu gieo trên bùn, sau gieo dùng tay hoặc tấm ván vỗ nhẹ để chìm mầm.

** Chăm sóc mạ trên nền đất cứng.*

Thường xuyên đủ ẩm. Tuyệt đối không bón đạm cho mạ. Khi nhiệt độ dưới 15°C dùng nilon trắng che phủ kín để chống rét. Phun trừ bọt trĩ, rệp khi đến ngưỡng, phun phòng bệnh đạo ôn trước khi nhổ cây 3 - 5 ngày.

2. Trên cây rau màu.

Trồng đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất: đối với cây rau họ bầu bí nên trồng từ đầu tháng 3 để đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ thấp. Đối với dưa lê, dưa hấu nên gieo trồng tập trung từ ngày 10/3 - 20/3/2024 thời tiết thuận lợi cho cây dưa phát triển và khi thu hoạch không bị cạnh tranh với sản phẩm của các cây ăn quả như: vải thiều, vải lai,...

a. Đối với cây con trong vườn ươm.

Dùng nilon trắng, và khum tre che phủ kín cho cây con trong vườn ươm. Chú ý: đảm bảo đủ ẩm, không để cây con chết rét khô. Dùng tro bếp hoặc phân chuồng ủ mục với phân lân để chống rét cho cây con.

b. Đối với cây con sau trồng.

Đối với dưa chuột, mướp đắng, bầu, bí nên dùng nilon chắn gió hướng Bắc, bảo đảm đủ ẩm, tưới bổ sung phân lân và kali để tăng khả năng chống rét.

II. PHÒNG CHỐNG ĐÓI, RÉT CHO VẬT NUÔI.

1. Đối với trâu, bò.

- Chuồng trại: chủ động gia cố, tu sửa, che chắn chuồng trại, chuẩn bị bạt, phen để che chắn, giữ ẩm và khô nền chuồng, đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi trong những ngày mưa, rét. Chuẩn bị đèn sưởi hoặc dự trữ chất đốt: củi, trấu, mùn cưa để đốt, sưởi cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại.

- Thức ăn: tận dụng triệt để các phế phụ phẩm nông nghiệp có thể làm thức ăn cho gia súc; thường xuyên kiểm tra việc bảo quản và dự trữ thức ăn, nhất là rơm rạ, cỏ khô; thực hiện chế biến thức ăn để tăng giá trị dinh dưỡng của thức ăn như: thức ăn xanh ủ chua, rơm ủ ure, ... Chuẩn bị thức ăn tinh (bột ngô, sắn, cám gạo...), các chất khoáng, vitamin để bổ sung dinh dưỡng cho gia súc trong những ngày giá rét.

- Chăm sóc nuôi dưỡng: tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc, nhất là bê, nghé cần có chế độ nuôi dưỡng phù hợp để tăng cường sức đề kháng phòng chống đói, rét và dịch bệnh; đối với trâu, bò già yếu nên có kế hoạch vỗ béo sớm để giết thịt làm thực phẩm.

+ Đảm bảo cung cấp đủ lượng thức ăn thô xanh cho trâu, bò (cỏ xanh, thân, lá ngô, cỏ ủ hoặc rơm khô, rơm ủ ure); có thể bổ sung thêm thức ăn

ting (bột ngô, sắn, cám gạo,...) từ 0,5 - 1kg/con/ngày (tùy theo trọng lượng gia súc); đồng thời cung cấp đủ nước uống sạch.

- + Bổ sung muối ăn với lượng 15g/ngày (tương đương với 3 thìa cà phê) bằng cách hoà vào nước uống (nước ấm là tốt nhất) cho trâu, bò uống.

- + Đặc biệt chú ý, những ngày rét đậm rét hại tăng từ 5 - 10% khẩu phần ăn so với ngày thường để vật nuôi có đủ năng lượng chống rét.

- + Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch chăn thả hợp lý. Hạn chế việc chăn thả gia súc khi nhiệt độ ngoài trời dưới 15⁰C (đặc biệt là gia súc nhỏ). Thời gian chăn thả tốt nhất: buổi sáng 8h, khi trời đã tan sương; buổi chiều: về trước 16h. Những ngày rét đậm, rét hại dưới 12⁰C kèm theo mưa phùn thì không chăn thả mà nhốt vật nuôi trong chuồng để tiện chăm sóc, quản lý. Đồng thời, tăng cường sưởi ấm vật nuôi bằng bóng điện sợi đốt, bóng hồng ngoại hoặc đốt củi, bếp than để sưởi.

Lưu ý: khi đốt lửa sưởi phải có đường ống dẫn khói thải ra ngoài chuồng, tránh hiện tượng ngạt, ngộ độc vật nuôi và vị trí đốt tránh xa chất độn chuồng, bạt che để phòng bén lửa gây cháy. Nên mặc áo ấm cho trâu bò bằng bao tải gai, bao tải dừa, chăn, áo cũ,...để chống rét.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng bệnh như: Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục,...

- Định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc bằng các loại hoá chất như: Han-Iodine, Virkon, Benkocid, Vetvaco Iodine,... hoặc rắc vôi bột.

2. Đối với lợn.

- Chuồng trại vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, không để tồn đọng phân, nước thải trong chuồng; che kín xung quanh chuồng nuôi, không để gió lùa nhất là vào ban đêm; làm chuồng úm đối với lợn con theo mẹ. Không cọ rửa chuồng hoặc tắm cho lợn vào những ngày mưa rét, nhiệt độ xuống dưới 12⁰C.

- Uống đủ nước sạch, bổ sung thêm các vitamin tổng hợp, men tiêu hoá trộn vào nước uống, thức ăn theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chống rét, dịch bệnh. Khẩu phần ăn đảm bảo đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng đối tượng lợn.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng bệnh như: Dịch tả lợn cổ điển, Tụ huyết trùng, Đóng dấu lợn, Tai xanh, Lở mồm long móng,...

- Định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc bằng các loại hoá chất như: Han-Iodine, Virkon, Benkocid, Vetvaco Iodine... hoặc rắc vôi bột.

3. Đối với gia cầm.

- Chuẩn bị đầy đủ phen, bạt,... để che chắn, chống gió lùa; bổ sung thêm bóng điện (bóng tròn, bóng hồng ngoại) để sưởi ấm cho gia cầm trong những ngày rét đậm, rét hại.

- Đảm bảo thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng, phù hợp với từng lứa tuổi của gia cầm; cho uống đủ nước sạch, ấm và bổ sung thêm đường gluco, các loại vitamin tổng hợp, men tiêu hoá để nâng cao sức đề kháng, tăng khả năng chống rét, dịch bệnh.

- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thay chất độn chuồng, đảm bảo chuồng nuôi không bị ẩm ướt.

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng bệnh như: Tụ huyết trùng, Cúm gia cầm, Newcastle, Gumboro, Đậu, Dịch tả vịt, Viêm gan do vi rút,...

- Định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc bằng các loại hoá chất như: Han-Iodine, Virkon, Benkocid, Vetvaco Iodine... hoặc rắc vôi bột.

Nhận được thông báo này, đề nghị các đồng chí trưởng thôn căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để chỉ đạo và hướng dẫn các hộ nông dân gieo trồng, chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi vụ xuân kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Lãnh đạo UBND Xã;
- Lãnh đạo HTXDVNN;
- Các đồng chí trưởng thôn;
- Đài TT xã;
- Lưu: VP, NVTY

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Huy